

TMA970**Matematik Chalmers****Tentamensskrivning i Inledande matematisk analys F / TM**

Datum: 2021-10-27, kl. 8:30 – 12:30.

Hjälpmittel: Inga

Telefonvakt: Jana Madjarova, ankn. 3531

=====

- 1.** Avgör om integralerna nedan konvergerar eller divergerar. Ge endast svar, d.v.s. konvergent / divergent.

(a) $\int_2^\infty \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x^3 - 1}} dx$; (b) $\int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{4 - x^2}}$; (c) $\int_0^1 \sqrt{x} \ln(\sin x) dx$.

Avgör om påståendena nedan är sanna eller falska. Ge endast svar, det vill säga sant/falskt. (Funktionen f antas vara deriverbar i \mathbb{R} .)

- (d) Om f är strängt växande i intervallet I , så gäller $f' > 0$ i I .
(e) Om $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \text{const}$, så gäller $\lim_{x \rightarrow \infty} |f'(x)| = 0$.
(f) Om $\lim_{x \rightarrow \infty} |f'(x)| = 0$, så gäller $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \text{const}$.

(Varje rätt svar ger 1p, varje fel svar ger -1p, inget svar ger 0p; hela uppgiften ger minst 0p.)

- 2.** Bestäm gränsvärdena (L'Hospitals regel och Taylorutvecklingar får ej användas)

(a) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \tan x$ (3p); (b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x)}{x^2}$ (3p).

- 3.** Rita grafen till funktionen $f(x) = e^{|\arctan x|}$. Ange asymptoter, lokala extrema, inflexionspunkter etc. (6p)

- 4.(a)** Bestäm en primitiv funktion till $f(x) = \frac{1}{x} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$. (3p)
(b) Beräkna $\int_1^2 (\ln x)^2 dx$. (3p)
(c) Avgör om integralen $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos x) dx$ är konvergent. Utför alla nödvändiga uppskattningar. (4p)

- 5.** Det reella talet α är sådant att gränsvärdet

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{(\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x})^\alpha}$$

är ändligt och skilt från 0. Bestäm L . (4p)

- 6.** Bestäm en primitiv funktion till funktionen $f(x) = |\sin x|$ i \mathbb{R} . Motivera väl! (6p)

7. Formulera och bevisa satsen om derivatan i lokala extrempunkter (i fallet lokalt minimum). (6p)

8. Formulera och bevisa analysens huvudsats. (6p)

Betygsgränser: 20-29p ger betyget 3; 30-39p ger betyget 4; 40p+ ger betyget 5.

/JM

TMA970 Inteckande matematisk

analys F1 / TM1

Lösningar 27/10-2021

1.

- (a) divergent ; (b) konvergent ;
- (c) konvergent ; (d) falskt !;
- (e) falskt ; (f) falskt !;

2.

$$(a) \text{ Sätt } t = \frac{\pi}{2} - x \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} - t$$

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{\sin(\frac{\pi}{2} - t)}{\cos(\frac{\pi}{2} - t)} = \frac{\cos t}{\sin t}$$

$$\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \tan x = t \cdot \frac{\cos t}{\sin t} = \frac{t}{\sin t} \cdot \cos t$$

$$x \rightarrow \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow t \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} - x\right) \tan x = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\sin t} \cdot \cos t = 1$$

(b)

$$\frac{\ln(\cos x)}{x^2} = \frac{\ln(1 + (\cos x - 1))}{x^2} = \frac{\overset{\text{u} \rightarrow 0}{0}}{0}$$

$$= \frac{\ln(1 + (\cos x - 1))}{\cos x - 1} \cdot \frac{\cos x - 1}{x^2} = \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{x^2}{8 \sin^2 x}$$

$$= - \frac{\ln(1 + (\cos x - 1))}{\cos x - 1} \cdot \frac{(1 - \cos x)(1 + \cos x)}{x^2 \cdot (1 + \cos x)} =$$

$$= - \frac{\ln(1 + ((\cos x - 1)))}{\cos x - 1} \cdot \frac{\sin^2 x}{x^2} \cdot \frac{1}{1 + \cos x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} -1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2},$$

3.

$$f(x) = e^{|\arctan x|}$$

2)

$$D_f = \mathbb{R}, \quad f > 0 \text{ i } \mathbb{R}$$

\arctan - nödde $\Rightarrow |\arctan|$ jämn
 $\Rightarrow f(x)$ jämn

\Rightarrow grafen symmetrisk m-a.g. y -axeln

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} e^{|\arctan x|} = e^{|1 \pm \frac{\pi}{2}|} = e^{\frac{\pi}{2}}$$

\Rightarrow sned (horisontell) asymptot
 i $\pm\infty$

många vertikala asymptoter, eftersom
 f kontinuerlig i hela \mathbb{R} .

$$x > 0 : f(x) = e^{\arctan x}$$

$$f'(x) = e^{\arctan x} \cdot \frac{1}{1+x^2} > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$\Rightarrow f$ växande (strägt)
 i $(0, \infty)$

$$x < 0 : f(x) = e^{-\arctan x}$$

$$f'(x) = e^{-\arctan x} \cdot \left(-\frac{1}{1+x^2}\right) < 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$\Rightarrow f$ (strägt) avtagande i $(-\infty, 0)$

(man kan även se det per symmetri)

$\Rightarrow f$ har lok. min i $x_0 = 0$

$$\exists f'(0)$$

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{e^{\arctan h} - 1}{h}$$

3

$$h \rightarrow 0 : \frac{e^{\operatorname{arctanh} h} - 1}{h} =$$

$$= \frac{e^{\operatorname{arctanh} h} - 1}{\operatorname{arctanh} h} \cdot \frac{\operatorname{arctanh} h}{h} =$$

$$= \underbrace{\frac{e^{\operatorname{arctanh} h} - 1}{\operatorname{arctanh} h}}_{\substack{\downarrow \\ 1, \text{ by } \operatorname{arctanh} h \rightarrow 0 \\ h \rightarrow 0}} \cdot \underbrace{\frac{\operatorname{arctanh} h}{\sin(\operatorname{arctanh} h)}}_{\substack{\downarrow \\ 1}} \cdot \underbrace{\cos(\operatorname{arctanh} h)}_{\substack{\downarrow \\ 1}}$$

$$\bullet 1, \text{ by } \operatorname{arctanh} h \rightarrow 0 \quad h \rightarrow 0$$

$$\bullet h < 0 : \frac{e^{-\operatorname{arctanh} h} - 1}{h} = \frac{e^{-\operatorname{arctanh} h} - 1}{-\operatorname{arctanh} h} \cdot \frac{-\operatorname{arctanh} h}{h}$$

$$\xrightarrow[h \rightarrow 0^-]{} -1$$

$$\Rightarrow \nexists f'(0)$$


$$\bullet f''(x) = \begin{cases} e^{\operatorname{arctan} x} \cdot \frac{1}{(1+x^2)^2} - e^{\operatorname{arctan} x} \cdot \frac{2x}{(1+x^2)^2}, & x > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} e^{-\operatorname{arctan} x} \cdot \left(-\frac{1}{1+x^2}\right)^2 + e^{-\operatorname{arctan} x} \cdot \frac{2x}{(1+x^2)^2}, & x < 0 \end{cases}$$

$$\bullet x > 0 : f''(x) = \underbrace{e^{\operatorname{arctan} x}}_{>0} \cdot \underbrace{\frac{1}{(1+x^2)^2}}_{>0} (1-2x)$$

$$f'' = 0 : x = \frac{1}{2} \quad \frac{x|_0 \frac{1}{2}}{f''|_0 + 0} -$$

$\Rightarrow f$ konvex i $(0, \frac{1}{2})$, konkav i $(\frac{1}{2}, \infty)$
 inflexion for $x = \frac{1}{2}$



4. (a) $\int x \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx = \begin{cases} t = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \\ t^2 = \frac{1-x}{1+x} \end{cases} \quad x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$

$$= \int \frac{1+t^2}{1-t^2} \cdot t \cdot \frac{-4t}{(1+t^2)^2} dt = +4 \int \frac{t^3}{(1+t^2)(1-t^2)} dt$$

$$\frac{t^2}{(1+t^2)(t-1)(t+1)} = \frac{A}{t-1} + \frac{B}{t+1} + \frac{Ct+D}{1+t^2}$$

$$t^2 = A(t+1)(1+t^2) + B(t-1)(1+t^2) + (Ct+D)(-1+t^2)$$

$$t=1: \quad 1 = 4A \Rightarrow A = 1/4$$

$$t=-1: \quad 1 = -4B \Rightarrow B = -1/4$$

$$t^3: \quad 0 = A+B+C \Rightarrow C = 0$$

$$t^0: \quad 0 = A-B-D \Rightarrow D = \frac{1}{2}$$

$$4 \left(\int \frac{t^2}{(t^2-1)(1+t^2)} dt \right) = 4 \cdot \frac{1}{4} \left(\int \frac{dt}{t-1} + \right.$$

$$\left. - 4 \cdot \frac{1}{4} \int \frac{dt}{t+1} + 4 \cdot \frac{1}{2} \int \frac{dt}{1+t^2} = \right.$$

$$= \ln|t-1| - \ln|t+1| + 2\arctan t (+ C)$$

Vi sätter in $t = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$:

$$\int \frac{1}{x} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx = \ln \left| \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} - 1 \right| - \ln \left| \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} + 1 \right| +$$

$$+ 2\arctan \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} (+ C)$$

$$(b) \int_1^2 (1 \cdot (\ln x)^2) dx = \left[x(\ln x)^2 \right]_1^2 - \int_1^2 x \cdot 2\ln x \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$= 2(\ln 2)^2 - 0 - \left(2x \ln x \right)_1^2 - 2 \int_1^2 x \cdot \frac{1}{x} dx =$$

$$= 2(\ln 2)^2 - 4\ln 2 + 0 + [2x]_1^2 =$$

$$= 2(\ln 2)^2 - 4\ln 2 + 4 + (-2) =$$

$$= 2(\ln 2)^2 - 4\ln 2 + 2$$

$$(c) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{\frac{\pi}{2}-\varepsilon} \ln(\cos x) dx =$$

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}-\varepsilon} \ln(\sin t) \cdot (-1) dt = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin t) dt =$$

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{8\sin t} \ln(\sin t) \cdot \frac{\sqrt{F}}{\sqrt{8\sin t}} \cdot \frac{1}{\sqrt{F}} dt$$

$$\sqrt{8mt} \cdot \ln(\sqrt{8mt}) \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} 0-$$

(6)

$$\sqrt{\frac{t}{8mt}} \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} 1$$

$$\Rightarrow \left| \sqrt{8mt} \cdot \ln(\sqrt{8mt}) \cdot \sqrt{\frac{t}{8mt}} \cdot \frac{1}{\sqrt{t}} \right| =$$

$$= \left| \sqrt{8mt} \cdot \ln(\sqrt{8mt}) \right| \cdot \sqrt{\frac{t}{8mt}} \cdot \frac{1}{\sqrt{t}} <$$

$$< \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{t}} \quad \text{for } t \neq \text{nära } 0$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{\sqrt{t}} \quad \text{konvergent}$$

$$\Rightarrow \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sqrt{8mt}) dt \quad \text{konvergent}$$

$$\Rightarrow \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos t) dt \quad \text{konvergent}$$

(5)

$$\frac{\tan x - \sin x}{(\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x})^\alpha} = \frac{\sin x (1 - \cos x)}{\cos x (\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x})^\alpha} =$$

$$= \frac{\sin x (1 - \cos x)(1 + \cos x)}{\cos x (1 + \cos x)(\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x})^\alpha} = \frac{\sin^3 x}{\cos x (1 + \cos x)(\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x})^\alpha}$$

$$= \frac{\sin^3 x ((\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})^\alpha)}{\cos x (1 + \cos x)(2x)^\alpha} \xrightarrow[2^\alpha]{} \begin{cases} 0 & \text{for } \alpha < 3 \\ 1/2 & \alpha = 3 \\ \infty & \text{for } \alpha > 3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow L = \frac{1}{2}.$$

G.

f kontinuerlig i \mathbb{R}
 $\Rightarrow f$ har en primitiv i \mathbb{R}

$$x \in [0, \pi] : |\sin x| = \sin x$$

en primitiv : $-\cos x + C_1$

$$x \in [-\pi, 0] : |\sin x| = -\sin x$$

en primitiv : $\cos x + C_2$

C_1 och C_2 måste väljas så att den primitiva till $|\sin x|$ i $[-\pi, \pi]$ blir kontinuerlig i 0

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} (\cos x + C_2) = 1 + C_2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (-\cos x + C_1) = -1 + C_1$$

$$\Rightarrow 1 + C_2 = -1 + C_1$$

$$\Rightarrow \text{vi kan välja t.ex. } \begin{cases} C_1 = 1 \\ C_2 = -1 \end{cases}$$

I 0:

$$\frac{(\pm \cos x \mp 1) - (1 - 1)}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

$\Rightarrow \exists$ derivata i 0 och den är $= 0 = \sin 0$

$$\Rightarrow f(x) = \begin{cases} \cos x - 1 & x < 0 \\ -\cos x + 1 & x \geq 0 \end{cases}$$

är en primitiv till $|\sin x|$ i $[-\pi, \pi]$

skrivs på samma sätt i alla platser $k\pi, k \in \mathbb{Z}$