

**TMA970****Matematik Chalmers****Tentamensskrivning i Inledande matematisk analys F / TM**

Datum: 2022-10-26, kl. 8:30 – 12:30.

Hjälpmittel: Inga

Telefonvakt: Jana Madjarova, ankn. 3531

- 
- 1.** Avgör om integralerna nedan konvergerar eller divergerar. Ge endast svar, d.v.s. konvergent / divergent.

(a)  $\int_0^\pi \frac{\sqrt{x} \sin x}{(\ln(x+1))^2} dx$ ; (b)  $\int_2^\infty \frac{x^2 e^{-x}}{x-1} dx$ ; (c)  $\int_0^\infty \frac{\ln(x^4+1)}{x^2+1} dx$ .

Avgör om påståendena nedan är sanna eller falska. Ge endast svar, det vill säga sant/falskt. Funktionen  $f$  antas vara definierad i  $[a, b]$ .

- (d) Om  $f$  är Riemannintegrerbar i  $[a, b]$ , så är  $f$  kontinuerlig i  $[a, b]$ .  
(e) Om  $f$  är kontinuerlig i  $[a, b]$ , så är  $f$  Riemannintegrerbar i  $[a, b]$ .  
(f) Om  $f$  är deriverbar i  $[a, b]$ , så är  $f$  Riemannintegrerbar i  $[a, b]$ .

(Varje rätt svar ger 1p, varje fel svar ger -1p, inget svar ger 0p; hela uppgiften ger minst 0p.)

- 2.** Bestäm gränsvärdena (L'Hospitals regel och Taylorutvecklingar får ej användas)

(a)  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{1 + \sin x} - \frac{2\sqrt{2}}{\pi}x}{x - \frac{\pi}{2}}$  (3p); (b)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + \sin x}{x \ln x + \cos x}$  (3p).

- 3.** Rita grafen till funktionen  $f(x) = \sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{x^2 + 1}$ . Ange asymptoter, lokala extrema, inflexionspunkter etc. (6p)

- 4.(a)** Bestäm en primitiv funktion till  $f(x) = \cos^2 \sqrt{x}$ . (3p)

**(b)** Beräkna  $\int_0^4 \frac{1 + e^{x/2}}{(1 + e^{x/4})^2} dx$ . (3p)

- 5.** Betrakta funktionen  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , där  $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ . Visa att  $f$  är en udda funktion. Bestäm  $f$ :s värdefält och finn  $f^{-1}$ . (5p)

- 6.** Funktionen  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  är kontinuerlig och icke-negativ i intervallet  $[a, b]$  samt sådan att  $f(x_0) > 0$  i någon punkt  $x_0 \in [a, b]$ . Visa att

$$\int_a^b f(x) dx > 0. \quad (6p)$$

**7.(a)** Definiera begreppet deriverbar funktion i en punkt. (2p)

**(b)** Visa att om en funktion är deriverbar i en punkt, så är den kontinuerlig i den punkten. (3p)

**(c)** Visa att funktionen

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & \text{för } x \neq 0 \\ 0 & \text{för } x = 0 \end{cases}$$

är deriverbar i hela  $\mathbb{R}$ , men att dess derivata inte är kontinuerlig i 0. (4p)

**8.** Formulera och bevisa analysens huvudsats (Newton-Leibniz sats). (6p)

Betygsgränser: 20-29p ger betyget 3; 30-39p ger betyget 4; 40p+ ger betyget 5.

/JM

TMA970 Inledande matematisk  
analys FI / TMI

Lösningar 26/10-22

1.

- (a) konvergent ; (b) konvergent ;
- (c) konvergent ; (d) falskt ;
- (e) sant ; (f) sant.

2.

$$(a) \text{ Sätt } t = \frac{\pi}{2} - x \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} - t$$

$$x \rightarrow \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow t \rightarrow 0$$

$$\begin{aligned} & \frac{\sqrt{1+\sin x} - \frac{2\sqrt{2}}{\pi} x}{x - \frac{\pi}{2}} = \frac{\sqrt{1+\cos t} - \frac{2\sqrt{2}}{\pi} (\frac{\pi}{2} - t)}{t} = \\ & = \frac{\sqrt{2\cos^2 \frac{t}{2}} - \sqrt{2} + \frac{2\sqrt{2}}{\pi} t}{t} = -\frac{\frac{2\sqrt{2}}{\pi} - \sqrt{2} - \frac{\cos \frac{t}{2} - 1}{t}}{t} \\ & \cos \frac{t}{2} > 0 \text{ när } 0 \\ & \Rightarrow |\cos \frac{t}{2}| = \cos \frac{t}{2} \\ & = -\frac{2\sqrt{2}}{\pi} + \sqrt{2} \cdot \frac{(1 - \cos \frac{t}{2})(1 + \cos \frac{t}{2})}{t(1 + \cos \frac{t}{2})} = \end{aligned}$$

$$= -\frac{2\sqrt{2}}{\pi} + \sqrt{2} \cdot \frac{\sin^2 \frac{t}{2}}{4 \left(\frac{t}{2}\right)^2} \cdot t \cdot \frac{1}{1 + \cos \frac{t}{2}} \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} -\frac{2\sqrt{2}}{\pi}$$

$$x \rightarrow \frac{\pi}{2}$$

$$(b) \frac{x^2 + \sin x}{x \ln x + \cos x} = \frac{x^2}{x \ln x} \cdot \frac{1 + \frac{\sin x}{x^2}}{1 + \frac{\cos x}{x \ln x}}$$

$$\xrightarrow[x \rightarrow \infty]{\infty}$$

$$\xrightarrow[x \rightarrow \infty]{0}$$

$$\textcircled{3}: f(x) = \sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{x^2 + 1}$$

$$D_f = \mathbb{R}$$

$$\sqrt[3]{x^2 + 1} > \sqrt[3]{x^2} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow f(x) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Symmetrier:  $f(-x) = f(x) \rightarrow$  jämn  
ej periodisk

Inga vertikala asymptoter.

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{x^2 + 1} &= \frac{x^2 - (x^2 + 1)}{(\sqrt[3]{x^2})^2 + \sqrt[3]{x^2} \sqrt[3]{x^2 + 1} + (\sqrt[3]{x^2 + 1})^2} = \\ &= \frac{-1}{x^{4/3} + x^{2/3}(x+1)^{1/3} + (x+1)^{2/3}} \xrightarrow{x \rightarrow \pm\infty} 0 \end{aligned}$$

$\rightarrow$  horisontell asymptot i  $\pm\infty$

(räcker i  $+\infty$ , eftersom  $f$  är jämn)

$$f'(x) = \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}} + \frac{(-1)}{3}(x+1)^{-\frac{2}{3}} \cdot 2x =$$

$$D_{f'}: \boxed{x \neq 0} \quad \frac{2((x+1)^{\frac{2}{3}} - x^{\frac{2}{3}})}{3x^{\frac{1}{3}}(x+1)^{\frac{2}{3}}}$$

täljaren  $> 0 \quad \forall x \in D_{f'}$

$$\text{nämnaren } \begin{cases} < 0 & \forall x < 0 \\ > 0 & \forall x > 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow f$  avtagande i  $(-\infty, 0)$

växande i  $(0, +\infty)$



$\Rightarrow f$  har lokalt (och globalt) minimum i 0

$$f(0) = -1$$

$$\begin{aligned}
 f''(x) &= -\frac{2}{9}x^{-\frac{4}{3}} - \frac{2}{3}(x^2+1)^{-\frac{2}{3}} + \\
 &+ \left(\frac{2}{3}\right)^2 x (x^2+1)^{-\frac{5}{3}} \cdot 2x = \\
 &= 2 \cdot \frac{-(x^2+1)^{\frac{5}{3}} - 3(x^2+1)x^{\frac{4}{3}} + 2^2 \cdot x^{\frac{10}{3}}}{9x^{\frac{4}{3}}(x^2+1)^{\frac{5}{3}}} = \\
 &= -2 \frac{(x^2+1)^{\frac{5}{3}} + 3x^{\frac{4}{3}} - x^{\frac{10}{3}}}{9x^{\frac{4}{3}}(x^2+1)^{\frac{5}{3}}} < 0, \quad \forall x \neq 0
 \end{aligned}$$

eftersom  $(x^2+1)^{\frac{5}{3}} > x^{\frac{10}{3}}$   
 $x^{\frac{4}{3}} > 0$

$\Rightarrow f$  konkav:  $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$



$$\textcircled{4} \quad (a) \int \cos^2 \sqrt{x} dx = \left[ \begin{array}{l} t = \sqrt{x} \\ x = t^2 \\ dt = 2t dt \end{array} \right] = \textcircled{4}$$

$$= \int 2t \cos^2 t dt = \int 2t \cdot \frac{1 + \cos 2t}{2} dt =$$

$$= \frac{t^2}{2} + \int t \cos 2t dt \stackrel{\text{P.I.}}{=}$$

$$= \frac{t^2}{2} + \frac{1}{2} t \sin 2t - \frac{1}{2} \int 1 \cdot \sin 2t dt =$$

$$= \frac{t^2}{2} + \frac{1}{2} t \sin 2t + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cos 2t (+C) =$$

$$= \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{x} \sin 2\sqrt{x} + \frac{1}{4} \cos 2\sqrt{x} (+C)$$

$$(b) \text{ Sätt } e^{\frac{x}{4}} = t, \quad x = 4 \ln t$$

$$e^{\frac{x}{2}} = t^2, \quad dx = \frac{4}{t} dt$$

$$x=0 : t=1 \quad ; \quad x=4 : t=e$$

$$\int_0^4 \frac{1+e^{x/2}}{(1+e^{x/4})^2} dx = \int_1^e \frac{1+t^2}{(1+t)^2} \cdot \frac{4}{t} dt = \textcircled{*}$$

$$\frac{1+t^2}{t(1+t)^2} = \frac{A}{t} + \frac{B}{1+t} + \frac{C}{(1+t)^2}$$

$$1+t^2 = A(1+t)^2 + Bt(1+t) + Ct$$

$$t=0 : 1 = A$$

$$t=-1 : 2 = -C \Rightarrow C = -2$$

$$t^2 : 1 = A + B \Rightarrow B = 1 - A = 0$$

$$\textcircled{*} = \left[ \ln t + 2 \cdot \frac{1}{1+t} \right]_1^e = \ln e + \frac{2}{1+e} - 0 - \ln 1 = \frac{2}{1+e}$$

5.

$D_f = \mathbb{R}$  symmetrisk  
m.a.p. 0

15

$$\begin{aligned}
 f(-x) &= \ln(-x + \sqrt{x^2 + 1}) = \\
 &= \ln \frac{(\sqrt{x^2+1} - x)(\sqrt{x^2+1} + x)}{\sqrt{x^2+1} + x} = \ln \frac{x^2+1 - x^2}{\sqrt{x^2+1} + x} = \\
 &= -\ln(x + \sqrt{x^2+1}) = -f(x) \\
 \Rightarrow f \text{ udda}
 \end{aligned}$$

f derivbar i  $\mathbb{R}$ ,  $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} > 0$   
(tabell derivata)

$\Rightarrow f$  strängt växande i  $\mathbb{R}$

$\Rightarrow f$  injektiv  $\Rightarrow f: \mathbb{R} \rightarrow V_f$  bijektion

$V_f:$   $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = " \ln(+\infty)" = \infty$   
f udda  $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$

$\Rightarrow V_f = \mathbb{R}$

$$\ln(x + \sqrt{x^2+1}) = y$$

$$\Leftrightarrow x + \sqrt{x^2+1} = e^y$$

$$\sqrt{x^2+1} = e^y - x$$

$$x^2+1 = e^{2y} - 2xe^y + x^2$$

$$x = \frac{e^{2y}-1}{2e^y} = \frac{e^y - e^{-y}}{2} \quad (= \sinh y)$$

Q.  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f \geq 0$

$x_0 \in [a, b]$  s.a.  $f(x_0) > 0$

Satz  $\varepsilon_0 = \frac{1}{2} f(x_0) > 0$

$\exists \delta_{\varepsilon_0} > 0 : \forall x \in [a, b], |x - x_0| < \delta_{\varepsilon_0}$

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon_0 = \frac{1}{2} f(x_0)$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{|f(x_0) - \frac{1}{2} f(x_0)|}_{= \frac{1}{2} f(x_0)} < f(x) < f(x_0) + \frac{1}{2} f(x_0)$$

$$= \frac{1}{2} f(x_0) > 0$$

$$\Rightarrow \int_a^b f(x) dx \geq \int_{[x_0 - \delta, x_0 + \delta] \cap [a, b]} f(x) dx >$$

$$> \delta \cdot \frac{1}{2} f(x_0) > 0.$$