

Tentamen i Matematisk analys,
fortsättningskurs F/TM, TMA976
17 Januari 2020, kl. 14.00-18.00

Examinator och tentarondsansvarig: Michael Björklund

Inga tillåtna hjälpmedel.

OBS: Motivera dina svar väl. Det är i huvudsak beräkningarna och motiveringarna som ger poäng, inte svaret. Skriv tydligt. För godkänt krävs minst 20 poäng sammanlagt.

1. Bestäm en lösning $y : (-\infty, 2) \rightarrow \mathbb{R}$ till initialvärdesproblemet

$$y(1) = 0 \quad \text{och} \quad xy'(x) = y(x)^2 + 3y(x) + 2.$$

Ledtråd: Använd likheten $\frac{1}{(1+y)(2+y)} = \frac{1}{1+y} - \frac{1}{2+y}$. (7p)

2. Givet ett heltal $n \geq 1$, låt $y_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ beteckna lösningen till initialvärdesproblemet

$$y_n(0) = y_n'(0) = 0 \quad \text{och} \quad y_n''(x) - 2\alpha_n y_n'(x) + \alpha_n^2 y_n(x) = x^2 e^{\alpha_n x},$$

där $\alpha_n = 4n \ln n$. Beräkna gränsvärdet $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n\left(\frac{1}{n}\right)$. (8p)

3. För vilka reella β konvergerar serien

$$\sum_{n=5}^{\infty} \frac{n^\beta}{(\ln n)^2} \left| \sin\left(\frac{1}{n}\right) - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \right|?$$

Ledtråd: Jämför med serien vars termer är $\frac{n^{\beta-2}}{(\ln n)^2}$ *för* $n \geq 5$. (7p)

4. Beräkna gränsvärdet

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x(1-x)) - 1 + \frac{x}{2} \sin x}{x^3}. \quad (7p)$$

5. För vilka reella x konvergerar potensserien $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} x^{n^2}$? Ange även för vilka x denna konvergens är betingad.

Ledtråd: Observera att n^2 *är udda om och endast om* n *är udda.* (6p)

6. Avgör huruvida gränsvärdet

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{1-\varepsilon} x^n (1-x)^{1/3} dx.$$

existerar. Om det gör det, så skall detta gränsvärde beräknas.

Ledtråd: Använd geometrisk summation. (9p)

7. Avgör huruvida gränsvärdet

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x \neq 0}} \frac{\frac{\sin(xy)}{x} + \sin x^2}{x^2 + y^2}$$

existerar eller inte. Om det existerar, så skall även dess värde beräknas. (6p)

Lösungsvorlog Texta TMA976, 17 sep 2020

1. $\frac{x}{1+x} = \frac{1}{1+x} \cdot x$

$\frac{1}{1+x} = \frac{1}{(1+x)^0} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$

$\frac{x}{1+x} = x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^n$

2. $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$

$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$

$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$

3. $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$

$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$

$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$

Samförelse! $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konv. $\iff \sum_{n=0}^{\infty} b_n$ konv.

Integralkriteriet!

$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx < \infty$

4. $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$

$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$

$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$

Kriterier:

Konv. (absolut) om $|x| < 1$

Div. om $|x| > 1$

bedingad konvergent

divergerar!

$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$

$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$

6. Fixera $0 < p < 1$, och $f_n(x) = x^n(1-x)^p$

$f_n(x) = x^n(1-x)^p \leq (1-x)^{n+1/p} \rightarrow \max_{x \in [0,1]} f_n(x) \rightarrow 0$

Geometrisk serie: $\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}$ konv. uttryckt på $[0, 1-e]$
 $\int_0^1 x^p (1-x)^{p/2} dx = \int_0^1 x^p \sum_{k=0}^{\infty} \binom{p/2}{k} (-x)^k dx$

$= \sum_{k=0}^{\infty} \binom{p/2}{k} (-1)^k \int_0^1 x^{p+k} dx = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{p/2}{k} (-1)^k \frac{1}{p+k+1}$
 $= \frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k$ (geom. summa)
 $\int_0^1 x^p (1-x)^{p/2} dx = \frac{1}{1-x} \Big|_0^1 = 1 - 1 = 0$
 $\rightarrow \boxed{0, \text{ om } p \rightarrow 0}$

ii. $\frac{d}{dx} \left(\frac{x^p}{x^p + c} \right) = \frac{p x^{p-1} (x^p + c) - x^p \cdot p x^{p-1}}{(x^p + c)^2} = \frac{p x^{p-1} c}{(x^p + c)^2}$

$= \frac{p x^{p-1} c}{(x^p + c)^2} = \frac{p x^{p-1} c}{x^{2p} + 2c x^p + c^2}$

$= \frac{p x^{p-1} c}{x^{2p} + 2c x^p + c^2} = \frac{p x^{p-1} c}{(x^p + c)^2}$
 $\rightarrow 1$
Kolla ännu $y=0$